







la suite de l'inhalation du produit. Dans ce cas, il conviendra d'interrompre ce traitement et de prescrire d'autres thérapeutiques ou d'autres formes d'administration.

- **FORADIL 12 µg/dose Poudre pour inhalation Boîte de 30 Gélules**

<b>Classe thérapeutique :</b>	<u>Pneumologie</u>
<b>Principes actifs :</b>	Formotérol
<b>Excipients :</b>	Lactose, gélatine

### Indications

- Traitement symptomatique continu de l'asthme et autres bronchopneumopathies obstructives réversibles :
  - . chez les patients nécessitant des prises quotidiennes de bêta2 agonistes à action rapide et de courte durée,
  - . et/ou en cas de symptômes nocturnes,en association avec un traitement anti-inflammatoire continu comme les corticoïdes inhalés.
- Traitement préventif de l'asthme induit par l'effort.

### Effets indésirables

- Peuvent rarement être observés : tremblements des extrémités (habituellement transitoires, liés à la dose et disparaissant avec la poursuite du traitement), céphalées, palpitations, tachycardie, réactions cutanées d'hypersensibilité, crampes musculaires.
- Chez les malades sensibles à l'inhalation d'une poudre sèche, il peut apparaître une irritation de la gorge avec toux ou un enrouement ; ceci peut être prévenu en se rinçant la bouche après inhalation.
- Des cas isolés de réactions d'hypersensibilité telles que urticaire, oedème de Quincke, prurit, exanthème et hypotension sévère ont été décrits.